

para pacientes inmunocomprometidos de forma moderada a grave
Incluye a los pacientes con cáncer de la sangre y la mayoría de los sobrevivientes

Si está inmunocomprometido de forma moderada a grave, tiene un riesgo más alto de sufrir COVID-19 grave y de morir. Además, la respuesta inmunitaria a la vacunación puede no ser tan fuerte como en las personas que no están inmunocomprometidas, por lo que se necesitan dosis de vacuna adicionales.

El 4 de mayo de 2023, los CDC actualizaron sus pautas orientativas para las dosis de vacunas contra la COVID-19 para todas las personas de 6 meses de edad en adelante. Las recomendaciones contenidas en este documento son para las personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Programas de vacunación por tipo de vacuna

Vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech

Edades 6 meses en adelante

Ya no se recomienda la vacuna monovalente de Pfizer-BioNTech y no se debe usar. Las personas que comenzaron la serie con la vacuna monovalente deben cambiar a la vacuna bivalente en la próxima dosis.



Dosis 1



Esperar al menos 3 semanas



Dosis 2



Esperar al menos 4 semanas
NOTA: Los niños de 6 meses a 4 años de edad deben esperar al menos 8 semanas para esta dosis.



Dosis 3



Esperar al menos 2 meses



Dosis 4 (debe ser bivalente)

Se recomienda esta dosis para todos aquellos que hayan recibido previamente solo la vacuna monovalente y es opcional para quienes hayan recibido previamente al menos una vacuna bivalente.

Vacuna contra la COVID-19 de Moderna

Edades 6 meses en adelante

Ya no se recomienda la vacuna monovalente de Moderna y no se debe usar. Las personas que comenzaron la serie con la vacuna monovalente deben cambiar a la vacuna bivalente en la próxima dosis.



Dosis 1



Esperar al menos 4 semanas



Dosis 2



Esperar al menos 4 semanas



Dosis 3



Esperar al menos 2 meses



Dosis 4 (debe ser bivalente)

Se recomienda esta dosis para todos aquellos que hayan recibido previamente solo la vacuna monovalente y es opcional para quienes hayan recibido previamente al menos una vacuna bivalente.

- Se pueden administrar dosis bivalentes adicionales a discreción del profesional de atención médica del paciente y con los intervalos que este determine.
- Los niños de 6 meses a 5 años deben recibir la misma marca de vacuna para todas las dosis bivalentes.


La única excepción es que los niños de 5 años de edad que recibieron previamente la vacuna bivalente de Moderna pueden recibir Moderna o Pfizer-BioNTech para las dosis adicionales. Desde los 6 años en adelante, se puede administrar cualquiera de las dos marcas independientemente de la que se haya usado para las dosis bivalentes anteriores.

Programas de vacunación por tipo de vacuna, continúa

Vacuna contra la COVID-19 de Novavax

Edades **12 años en adelante**

Se recomienda que las personas de 12 años en adelante que recibieron previamente 1 o más dosis de la vacuna monovalente contra la COVID-19 de Novavax reciban 1 dosis de la vacuna bivalente de tipo ARNm. Las personas que no pueden o no quieren recibir las vacunas de tipo ARNm pueden recibir la serie de dos dosis de Novavax.



Vacúnese según las recomendaciones, incluso si tuvo COVID-19



Siga cumpliendo con el distanciamiento social y lleve mascarilla



Hable con su equipo de profesionales médicos si no está seguro sobre su riesgo